

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

für die Tage vor und nach der Probenentnahme möchten wir Ihnen folgende hilfreiche Verhaltensregeln an die Hand geben:

- Es darf kein Aspirin oder ein aspirinhaltiges Medikament (mit Salicylsäure, Salicylat oder Spalt-Tabletten) mindestens 8 Tage vor der Probenentnahme sowie 8 Tage danach eingenommen werden! Erlaubt ist bei Schmerzen, soweit Sie diese Medikamente vertragen, z.B. Ben-u-ron oder Paracetamol, Ibuprofen, Voltaren oder Novalgin.

- Wird bei Ihnen eine laufende sog. Blutverdünnungstherapie durchgeführt, muss diese in Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt abgesetzt werden, ggf. muss eine Ersatztherapie durchgeführt werden.

- Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie Diabetiker/-in sind, eine künstliche Herzklappe haben, oder Lokalanästhesie (z.B. beim Zahnarzt) nicht vertragen haben bzw. diese nur schlecht gewirkt hat. In diesem Fall sind dann ggf. besondere Maßnahmen nötig.

- Einige Tage vor der Probenentnahme sollten Sie sich von Ihrem Hausarzt zur Bestimmung der Gerinnungswerte (Quick PTT, Thrombozyten), Blut abnehmen lassen und diese zur Untersuchung mitbringen.

- Am Abend vor der Entnahme und am Tag der Probenentnahme trinken Sie bitte keinen Alkohol (ggf. Unverträglichkeit mit Lokalanästhesie). Zu viel Alkohol ist auch an den Folgetagen zu vermeiden (Gefäßerweiterung).

WICHTIG: kommen Sie zur Probenentnahme nicht nüchtern! Bitte Frühstück einnehmen!

- Nach der Probenentnahme dürfen Sie kein Fahrzeug führen, da lokale Betäubungsmittel in Ausnahmefällen zu Konzentrationsstörungen führen können. Lassen Sie sich an diesem Tag möglichst begleiten, oder wenn dies nicht möglich ist, benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel.

- Nach der Probenentnahme wird Ihnen ein Druckverband angelegt, den Sie nach 24 Std. abnehmen dürfen. Die kleinen, sterilen Pflaster können nach 2 Tagen entfernt werden. Sie dürfen dann wieder duschen. Nach 8 Tagen dürfen Sie auch wieder baden.

- Bitte schonen Sie sich für 8 Tage nach der Probenentnahme (keine schweren Arbeiten, nicht schwer heben, kein Sport, keine Sauna, nicht schwimmen).

- Sollte wider Erwarten eine Blutung auftreten, drücken Sie bitte für mindestens 20 Minuten mit der flachen Hand oder einem Buch auf diese Stelle und die Brust. Es besteht für Sie keine akute Gefahr, es sollte jedoch ein größerer Bluterguss vermieden werden. Danach suchen Sie bitte während der Sprechzeiten einen Arzt unserer Praxis oder außerhalb dieser Zeiten den ärztlichen Bereitschaftsdienst bzw. ein Krankenhaus in Ihrer Nähe auf.

Bei Schmerzen bitte nur die oben genannten Medikamente einnehmen. Kühlen Sie die betroffene Stelle, jedoch geben Sie bitte kein Eis direkt auf die Haut!

- Wenn Ihnen eine sonstige Besonderheit auffällt, stellen Sie sich bitte erneut bei uns vor.

- Bei Beschwerden nach der Probenentnahme stehen wir Ihnen zu unseren Sprechzeiten gerne jederzeit zur Verfügung und bitten um kurze telefonische Mitteilung (08031/23097-0).

Nachts und am Wochenende wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder ein Krankenhaus in Ihrer Nähe.

- Das histologische Ergebnis besprechen wir mit Ihnen in der Regel am nächsten Werktag.

Wir wünschen Ihnen gute Genesung und erhoffen mit Ihnen ein gutes Ergebnis der Untersuchung!

Ihr Praxisteam

.....
KERNSPINTOMOGRAFIE COMPUTERTOMOGRAFIE NUKLEARMEDIZIN DIGITALE MAMMOGRAFIE DIGITALES RÖNTGEN KNOCHENDICHTEMESSUNG SONOGRAFIE

Praxis Ärztehaus
Salinstraße 11a
83022 Rosenheim
Telefon 08031 23097-0
Fax 08031 23097-120

Kernspintomografie im Ärztehaus Stadtmitte
Stollstraße 6
83022 Rosenheim
Telefon 08031 23097-20
Fax 08031 23097-220

Kernspintomografie im Aicherpark
Äußere Münchener Straße 94
83026 Rosenheim
Telefon 08031 23097-10
Fax 08031 23097-110

www.radiologie-rosenheim.de
info@rad-ro.de